



### **Область интереса для врачей акушеров-гинекологов:**

- Аномалии матки и влагалища;
- Пороки развития матки и влагалища;
- Кисты шейки матки, влагалища и вульвы;
- Лейомиомы;
- Аденомиоз;
- Эндометриоз;
- Рак эндометрия;
- Рак шейки матки;
- Рак влагалища и вульвы;
- Кисты яичника (ретенционные, эндометриодные и пр.
- Цистаденомы и рак яичников;
- Выраженные воспалительные изменения придатков матки;
- Скопление жидкости в малом тазу;

---

**Мы работаем ежедневно с 08:00 – 20:00**

г. Сургут, ул. Быстринская, д. 22А

**Запись по телефону 8 (3462) 22-18-22**

Мы всегда рады ответить на вопросы, которые Вы можете отправить

**e-mail: [info@mrtsurgut.ru](mailto:info@mrtsurgut.ru)**



## Противопоказания и подготовка к исследованию

### Абсолютные противопоказания

- клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства);
- кардиостимулятор, водитель ритма сердца.

### Относительные противопоказания

- ферромагнитные клипсы на сосудах и внутренних органах;
- металл в глазах (стружка);
- металлические фрагменты или шrapнeль;
- имплантированные электрические устройства и стимуляторы;
- расширители тканей (стенты);
- беременность в первом триместре.

### При контрастном усилении абсолютным противопоказанием является:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к препаратам, содержащим гадолиний;
- при беременности — использование только по жизненным показаниям (в норме препарат не проходит через гемоплацентарный барьер);
- кормление грудью может быть возобновлено не ранее 24 часов после введения препарата;
- особая осторожность требуется при снижении почечной фильтрации и нарушении функции печени;
- сахарный диабет.

## ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

| Наименование исследований   | Подготовка пациента  |
|---|--|
| Головной мозг<br>Сосуды головного мозга<br>Гипофиз<br>Орбиты<br>Придаточные пазухи носа<br>Органы средостения | Подготовка не требуется.   |
| Суставы<br>Позвоночник<br>Мягкие ткани  | За сутки не применять никаких мазей и гелей на область исследования.   |
| Органы малого таза  | Натощак, не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа» + умеренно наполненный мочевой пузырь (0,5 литра не газированной воды за 1 час до обследования). Для женщин с 10-20 день менструального цикла. |
| Органы брюшной полости  | Голод за 3 часа до исследования. Не курить, жевательную резинку не жевать. Не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа».   |

**Рентгенография** малоинформативна и несёт значительную лучевую (радиационную) нагрузку. **КТ** — более современный метод, но также сопряжён со значительной лучевой нагрузкой.

**И только МРТ — безопасный метод исследования, с высокой тканевой контрастностью, дающий вам возможность наблюдать пациента многократно, если необходимо - в динамике.**