



Область интереса врачей урологов и нефрологов:

ПОЧКИ

А) Врожденные пороки развития.

Б) Кисты почек:

- простые кисты почек;
- аутосомно-доминантный поликистоз почек.

В) Опухоли:

1. доброкачественные:
 - онкоцитомы;
 - ангиомиолипома.
2. Злокачественные:
 - почечноклеточный рак;
 - метастатическое поражение почек;
 - метастазы почечноклеточного рака;
 - уротелиальная карцинома лоханки.

Г) Воспалительные заболевания:

- острый пиелонефрит;
- пионефроз;
- абсцесс почки;
- хронический пиелонефрит;
- ксантогранулематозный пиелонефрит;
- липоматоз почечного синуса.

Д) Гидронефротическая трансформация

Е) Ретроперитонеальный фиброз

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

1. Уротелиальные опухоли;
2. Метастазы рака мочевого пузыря, лимфаденопатия;
3. Дивертикулы мочевого пузыря;
4. Нарушение заращение мочевого протока (урахуса).

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

1. Доброкачественная гиперплазия простаты;
2. Рак предстательной железы;
3. Острый простатит; абсцесс простаты;
4. Везикулит, пороки развития, заболевания семенных пузырьков.

НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

1. Травма полового члена;
2. Болезнь Пейрони;
3. Первичные опухоли и метастазы в половой член;
4. Фиброз; тромбоз кавернозных тел;
5. Последствия приапизма;
6. Водянка яичек, варикоцеле;
7. Эпидидимоорхит.

Мы работаем ежедневно с 08:00 – 20:00

г. Сургут, ул. Быстринская, д. 22А

Запись по телефону 8 (3462) 22-18-22

Мы всегда рады ответить на вопросы, которые Вы можете отправить

e-mail: info@mrt Surgut.ru



Противопоказания и подготовка к исследованию

Абсолютные противопоказания

- клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства);
- кардиостимулятор, водитель ритма сердца.

Относительные противопоказания

- ферромагнитные клипсы на сосудах и внутренних органах;
- металл в глазах (стружка);
- металлические фрагменты или шrapнeль;
- имплантированные электрические устройства и стимуляторы;
- расширители тканей (стенты);
- беременность в первом триместре.

При контрастном усилении абсолютным противопоказанием является:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к препаратам, содержащим гадолиний;
- при беременности — использование только по жизненным показаниям (в норме препарат не проходит через гемоплацентарный барьер);
- кормление грудью может быть возобновлено не ранее 24 часов после введения препарата;
- особая осторожность требуется при снижении почечной фильтрации и нарушении функции печени;
- сахарный диабет.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

Наименование исследований	Подготовка пациента
Головной мозг Сосуды головного мозга Гипофиз Орбиты Придаточные пазухи носа Органы средостения	Подготовка не требуется.
Суставы Позвоночник Мягкие ткани	За сутки не применять никаких мазей и гелей на область исследования.
Органы малого таза	Натощак, не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа» + умеренно наполненный мочевой пузырь (0,5 литра не газированной воды за 1 час до обследования). Для женщин с 10-20 день менструального цикла.
Органы брюшной полости	Голод за 3 часа до исследования. Не курить, жевательную резинку не жевать. Не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа».

Рентгенография малоинформативна и несёт значительную лучевую (радиационную) нагрузку. **КТ** — более современный метод, но также сопряжён со значительной лучевой нагрузкой.

И только МРТ — безопасный метод исследования, с высокой тканевой контрастностью, дающий вам возможность наблюдать пациента многократно, если необходимо - в динамике.